

ENDES MIHÁLY- SZABÓ SÁNDOR

A Rakaca-patakvidék rákfaunájáról

A vidék fő folyása, a Rakaca-patak neve a szomszédos Szlovákiából származik: a rakovica szó rákban gazdag vizet jelent, s ez a megállapítás, ha kisebb mértékben is, de napjainkban is érvényes. Kutatásaink során kereken tíz faj került elő, bár ez a szám aligha tekinthető véglegesnek. Zömük /8/ faj vízi, 2 ászkarák szárazföldi életmódú, a Daphnia fajok itt patakokban is előfordulnak. Az egyedül a névadó Rakaca-patak sóderes, köves, illetőleg kemény, márgás mederaljú szakaszairól (Rakacaszend, Szászfa) kimutatott kövi rák-adata új hazai lelőhelyet jelent- időnként lesodródik a víztárolóba, ahol, védett létére az itt gyakori folyami rák és a ritkább kecskerák fogására kihelyezett varsák zsákmányává válik.

CLADOCERA

Daphnia pulex 1., 7., 17., 20., 21. vizsgálópontok
Daphnia longispina 1., 7., 20.

COPEPODA

Megacyclops viridis 7., 21.

DECAPODA

Austropotamobius torrentium 1., 7.
Astacus astacus 1., 7.
Astacus leptodactylus 1., 7.

ISPODA

Asellus aquaticus 1., 2., 7., 12., 17., 19., 20., 21.
Armadillum vulgare 2., 5., 7., 10., 18., 19., 21.
Porcellio scaber 1., 7., 17., 20.

AMPHIPODA

Gammarus pulex 1., 7., 17., 19., 20., 21.

IRODALOM

ENDES, M. 1995., „Pf. 47.” / Kövi rák adatok / . Élet és Tudomány, 37.: 1177.