



Fattyúszerkő (*Chlidonias hybrida*) fészke szürke gém (*Ardea cinerea*) tollakkal. Siteri-lapos (Pród), 2011. 06. 23.  
(Fotó: Endes M.)

Nest of Whiskered Tern (*Chlidonias hybrida*) with Grey Heron (*Ardea cinerea*) feathers. Siteri-lapos marsh (Pród), 23-06-2011.(Photo: M. Endes)

**KAKUKK (*CUCULUS CANORUS*) NEVELKEDÉSE ZÁRT ÉPÜLETBEN.** Debrecen-Józsa kertés-házás („falusias”) részének közvetlen környezetében különböző korú, területű és faösszetételű erdőállományok találhatók, amelyek többsége azonban csupán néhány hektáros, zömmel 30-40 éves ültetett akác, „papír” nyár és erdeifenyő, s csak minimális az idős tölgyes. Lokálisan patakparti fehér és hamvas fűz állományok húzódnak. A kakukk, amely a hazai szakirodalom szerint „az emberi településeket kerüli” (Bankovics A. 2008. Magyarország madarainak névjegyzéke: 144.) a tágabb környéken szórványos, de tojásrakó státuszú, s tavaszi vonulása idején hallható. P. M. biológus beszámolója (lásd az általa készített fotókat is) szerint kertjében, lakóházától méterekre kisebb kamra-jellegű épület áll, amelynek ajtaját és ablakait általában és tartósan zárva tartják. Ebben esztendőök óta sikeresen költ évente kétszer a házi rozsdafarkú (*Phoenicurus ochrurus*) egy párja. A madarak az ajtó feletti, számukra éppen átjárható résen, illetőleg a 40x40 cm méretű palával borított oldalfalak egyikének kb. tenyérnyi nyílásán át közlekednek. Az utóbbi bejárót a tulajdonos e célból készítette. 2009. júniusában a pár éppen második fészekalját ülte az egyik földmentartó gerendára, egy műanyag edénybe épített fészében. P. M. az egyik napon belépve az épületbe, meglepetéssel észlelte, hogy a rozsdafarkúak egy kb. rigó nagyságú, tollasodó kakukkfiókát etetnek, amely közeledésére kiugrott a fészekből a padlóra. Ezt látva a tulajdonos elhagyta és bezárta a kamrát, a másnapi ellenőrzés során viszont nem észlelte madarunkat. A gazdaszülők azonban „egy darabig” még a kertben tevékenykedtek, bár etetést nem figyelt meg, s kakukk mutatkozását vagy hangját nem észlelte, illetőleg nem hallotta. Mindent egybevetve elgondolkodtató a kakukk tojó rutin ösztönvilágát messze meghaladó intelligenciája: bemerészkedni lakott területre, kifigyelni a cél-szülők viselkedését, abból következtetéseket vonni le, végül ennek alapján sikerrel végződő

próbálkozást végrehajtani, egy valószínűleg számára teljesen ismeretlen körülményeket felvonultató világba. Az adatközlőnek ezúton mondok köszönetet az információkért és a publikálás lehetőségének átengedéséért. A helyszínt később magam is megtekintettem.

Endes Mihály



Kakukk (*Cuculus canorus*) fióka nevelkedésének helyszíne. Debrecen-Józsa, 2009. június. (Fotó: Pap M.)  
Site of growing-up of a Cuckoo (*Cuculus canorus*). Debrecen-Józsa, June of 2009. (Photo: M. Pap)



Házi rozsdafarkú (*Phoenicurus ochruros*) fészke. Debrecen-Józsa, 2009. június. (Fotó: Pap M.)  
Nest of Black Redstart (*Phoenicurus ochruros*). Debrecen-Józsa, June of 2009. (Photo: M. Pap)