

Ilyenkor viszont az épület körül és annak falán, repedésekben áttelelő helyet kereső legyek jelentik a rovar táplálék zömét a verebeknek, cinegéknek, ám a tél beálltával ez is megszűnik számukra. Marad a magvakból álló, főleg a madáretetőkben található eleség, amit a Botanikus Kert mint legközelebbi eleséglelő hely már évek óta biztosít a verébcsaládoknak. Megjegyzendő, hogy a parlagfű elleni szakadatlan, de sajnos eredménytelen harc jegyében végzett fűnyírás miatt egyre kevesebb az olyan terület, ahol a verebek gyommagvakkal táplálkozhatnak. Ezzel jelentősen beszűkült az urbanizált, város lakó verebek táplálékforrása. Ezek a verebek lehetőségeiket kihasználva tömegesen jelennek meg a gabonatarolók, takarmánykeverők, malmok környékén, ahol a téli hónapokban is bőséges táplálékhoz jutnak.

Szabó Sándor

TENGELIC (*CARDUELIS CARDUELIS*) KÜLÖNÖS FÉSZKELÉSE A ROMÁNIAI MAROSLUDAS (LUDUS) KÖZSÉGBEN. 2011. 07. 03-án a falu központjában egy benzinkút parkolójának egyik magányos, alacsony tuja (*Thuja sp.*) fáján mellmagasságban tengelic fészekre bukkantunk. A madarak vélhetően hozzászoktak a zavaráshoz, mivel jöttünkre alig pár méterre repültek tova, egy kerítés tetejére, ahonnan cseppet sem panaszosan énekeltek. A falu középvonalát egy patak szeli ketté, viszonylag széles beépítetlen területtel a partokon, a benzinkút pedig ennek a szélén épült, ez magyarázhatja élőhely választásukat.

Szűcs Mónika, Löki Viktor

ÉRDEKESEBB MADÁRTANI ADATOK MISKOLC ÉS KÖRNYÉKÉNEK FAUNÁJÁHOZ. 1997-2000. közötti években Miskolc és környékén megfigyelt érdekesebb adatokat adjuk közre. A belváros légtérben békászó sas (*Aquila pomarina*), kígyászölyv (*Circaetus gallicus*), és kabasólyom (*Falco subbuteo*) fordult elő 1999. májusában. A fent említett időszakban 1 pár gyöngybagoly (*Tyto alba*) a belvárosban mind a négy évben, feltehetően költőfajként szerepelt. Nem volt ritka a tavaszi időszakban a város felett átrepülő darvak (*Grus grus*) látványa sem. A Szinva-patak kikövezett részén, szintén a belvárosban, két esetben erdei cankót (*Tringa ochropus*) és egy esetben billegetőcankót (*Actitis hypoleucos*) figyeltünk meg. 1998. 11. 22-én a Madarász Viktor utcában (belváros), egy elgázolt nagy örgébicsre (*Lanius excubitor*) figyeltünk fel. Miskolc-Tapolcán 1997 és 1998-ban biztosan fészkel a csíz (*Carduelis spinus*) a két fürdő közötti park területén. 1997. 06. 21-én a Tapolcai kőbányából egy uhu (*Bubo bubo*) fiókat hoztak a Vadasparkba, 1998-ban az említett területen, költés időben többször hallottuk a faj jellegzetes hangját.

Vizslán Tibor, Pingitzer Beáta

KÖZÖNSÉGES TÖRPEDENEVÉR (*PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS*) GYŐRBE. Győrben, a gyárvárosi területen, 2011. nyarán több esetben előfordult a faj egy-egy példánya.

Vizslán Tibor