

pld.; Sátoraljaújhely, padláson 1 elpusztult; Viss, padláson 1 elpusztult. Jelenlétüket a nagy patkósorrú denevérekéhez hasonló okokkal magyarázom.

Hegyesorrú denevér (*Myotis blythi oxygnathus*): a tiszai Alföld északkeleti részén rohamosan fogyó, sőt sokfelé már eltűnő faj. A Beregi-síkságon és a Rétközben nem észleltem, a Szatmári-síkságon 3 helyen találtam 1-1 példányát, ebből csak egy volt élő. Alsóbereckiben, padláson 4-5 pld. fiakkal, Tokajban, padláson 20 pld. fiakkal. Az északnyírségi populációk esetében mindenütt igen sok elpusztult adult állat figyelhető meg. Minden bizonnyal e faj különlegesen érzékeny lehet valamely pesticidre.

Csonkafülű denevér (*Myotis emarginatus*): Tokaj, padláson 30 példányból álló populáció, számos fiatalal. Telelőhelyük jelenleg még ismeretlen.

Denevér-telepítési akció keretében 1989-ben több helyen szereltünk fel mesterséges odukat. A munkát folytatjuk, s a rendszeres ellenőrzést is biztosítjuk.

Megfigyelések

TÖRPEMANDULA (*AMYGDALUS NANA*) A DÉLI HAJDÚSÁGBAN. Kabak közelében, műút és agrárterület közötti árokparton 1989-ben több foltban, néhány négyzetméteren kb. 500, zömmel virágzó tő, közöttük kökény apró bokrai. Az út túloldalán néhány példány macskahere (*Phlomis tuberosa*). Az egykori löszhát-maradvány védelmet érdemelne.

Endes Mihály

KÖVI RÁK (*ASTACUS TORRENTIUM*) A DUNÁBAN. A folyó nagy-marosi szakaszán 1989-ben egy élő, adult példányt észleltem.

Endes Mihály

ÚJABB EZÜSTKÁRÁSZ (*CARASSIUS AURATUS GIBELIO*) ADATOK A TISZÁBÓL. 1989-ben Tisza-mogyorósnál számos, 20 cm körüli példány került elő, főként a csöndesebb öblökben, kőgátaknál. A dombrádi szakaszon igen sok, szinte kivétel nélkül egynyaras méretű él, amelyek a sodrás elleni védekezésül a széli gyökérzetbe és lágyszárúak közé bújnak. Nem zárható ki kijutásuk más, környékbéli álló, vagy lassan folyó vízből, akár határainkon túlról is. A Krasznában és a Bodrogban megtaláltam a fajt, s lejjebb a Közép-Tiszában pedig már közönséges.

Endes Mihály

KÁRÓKATONA (PHALACROCORAX CARBO) ELŐFORDULÁSA LÉTA-
VÉRTESEN. Ez év májustól július közepéig többször megfi-
gyeltem egy kárókatontát Létavértesen, a község déli szélén,
a Pocsajba vezető út mellett található lefolyástalan, se-
kély vizű kis tóban. A szabad vízfelület kb. 0,5 ha volt.
A tó szélén dúsan nő a nád és a keskenylevelű gyékény. A
tó közepén, ahol kb. 0,5 m lehet a vízmélység, egy sás-
sziget van. Fa nincs a közelben, ezért a madár a tó köze-
pén lévő feneketlen hordóra ült ki rendszeresen napozni.
Gyakran keresztül is úszott a hordón. Létavértesi horgá-
szok megfigyelték, hogy éjszakáit a községtől kb. 5 km-re
található horgásztavon töltötte, ahol több kiszáradt, nagy
nyárfa áll a mesterségesen felduzzasztott, halban igen
gazdag vízben.

Barna Tamás

APÁCALÚD (BRANTA LEUCOPSIS) MEGFIGYELÉS. 1986. márci-
us 31-én Berettyóújfalu és Tépe között vízállásos terüle-
ten egy példányt figyeltem meg. A környéken több madár nem
került elő.

Vizslán Tibor

KONTYOS RÉCE (AYTHYA FULIGULA) MEGFIGYELÉSEK. 1989-
ben Sátoraljaújhely szélén, valamint Szabolcsveresmart kö-
zelében található tavakon május végétől augusztus elejéig
(tovább nem kísértem figyelemmel) észleltem 2 hím és 1 to-
jó, illetve 8 hím és 2 tojó példányt. Költésre utaló jelet

- bár udvarló magatartást többször láttam - egyik esetben
sem tapasztaltam.

Endes Mihály

BARNA KÁNYA (MILVUS MIGRANS) KÖLTÉSE MONOSTORPÁLYI
KÖZELÉBEN. 1989-ben, löszháti agrárterületek közötti kb.
két hektáros vízállásos, nádas mélyedés néhány fehér fűz-
fájának egyikén építette fészket a pár. Ennek alapjául egy
- meglehetősen fiatal, vékony törzsű fán készülő - dolmá-
nyos varjú fészek szolgált, amelynek birtoklásáért nagy
küzdelem folyt a párok között. Egy idős fűzön megtaláltuk
a kányák előző években használt fészket is, amelyben azon-
ban ez idő tájt vörös vércse költött (felette két méterrel
pedig szarkapár nevelte utódait). Újabb látogatásunk ide-
jén már három, részben kirepült fiatal barna kányát lát-
tunk, amelyeket a szülők a közvetlen közeli gabonatarlók-
ról származó kisemlősökkel etettek. Feltehetően ezt a párt,
illetve utódaikat figyelhették meg többen, már évekkel ez-
előtt is a környező tavaknál.

Endes Mihály, Endes Péter,

Balogh Péter, Micskei Zsolt

TÖRPESAS (HIERAAËTUS PENNATUS) MEGFIGYELÉSE HAJDÚ-
NÁNÁS HATÁRÁBAN. 1989. augusztus 6-án Hajdúnánás mellett
lévő Varjas-részen egy világos változatú példányt figyel-
tünk meg, a HEROSZ tábor néhány tagjával. A madár tőlünk
nem messze siklott el, így jól megfigyelhettük világos

szárnybélését és sötét evezőtollait.

Szilágyi Attila

HAMVAS RÉTIHÉJA (CIRCUS PYGARGUS) MEGFIGYELÉSEK. 1989 júliusában Ricsétől délre gabonaföld felett, valamint Domb-rád mellett észleltem egy-egy hím példányt. Költést nem figyeltem meg.

Endes Mihály

KERECSENSÓLYOM (FALCO CHERRUG) FÉSZKELÉS A HORTOBÁGYON. Az elmúlt években egyre több, fészkelési időben történt megfigyelés alapján kezdtük el tüzetesebben kutatni az egyes pusztarészeket. Már 1988-ban is feltételeztük költését, mivel március 23-án egy nászrepülő párt figyeltünk meg a HNP északi részén, azonban a fészket nem sikerült megtalálnunk.

Ez év május 18-án láttunk egy öreg hímét, amit aktív vetési varjú telep felett többször körözött, majd beült egy szélső fára. Másnap a tojót is sikerült meglátnunk, amint ürgével húzott be a varjútelepre. Eközben a hím folyamatosan "felderítő" repüléseket végzett az erdő felett. Magát a fészket ebben az időpontban a több száz as kolóniában nem találtuk meg. Pedig ez annál is fontosabb lett volna, mert ebben az időszakban kezdik szedni és löfegyverrel illegálisan vadászni a már erősen tokosodó varjúfiókákat. Ezért a sólymok háborítatlanságának biztosítása érdekében elkezdtek őrizni az erdőrészletet. A HNP te-

ületkezelője, Galgóczy Tamás önfeláldozó segítségével döntő volt, hogy végül is sikerült nap mint nap eltéríteni az ideérkező vadászokat és más személyeket akik feldúlták volna a telepet. Végül június 10-én a fészket is megtalálta a már két teljesen kitollasodott fiókával. Június 12-én már csak az egyik fióka tartózkodott benne, s június 14-én már üresen találtuk a fészket. A rákövetkező napokban a környéken többször sikerült megfigyelni az "élelmet kérő" két fiókát, a szülőmadarakkal együtt.

A pusztán ez volt az első bizonyítottan sikeres költés, s biztosra vesszük, hogy a faj lassú állománynövekedése eredményeként terjeszkedik ismét az alföldi élőhelyeken. Ebben nem kis szerepe lehet a Bükk Nemzeti Park területén öt éve tartó fészkekőrzéseknek.

Sándor István, Dudás Miklós

SARLÓS PARTFUTÓ (CALIDRIS FERRUGINEA) ADATOK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBŐL 1983-1988 KÖZÖTT. A sarlós partfutó 04 hótól 06 hó elejéig és 07 hó végétől 10 hó közepéig rendszeresen átvonuló a Hortobágyon és Hajdú-Bihar megye más tájain is többször előfordult. A legtöbb megfigyelésünk leengedett tavakról származik, de szikes tavaknál és libanevelőknél is gyakran látható.

1983: Hosszúpályi 09.03. 1 pld. szikes tó, Hortobágyi halastó 10.05. 7 pld.

1984: Csécsi tó 07.25. 1 pld., Hortobágyi halastó 10.14. 8 pld.

- 1985: Hortobágyi halastó 04.04. 1 pld., 08.25. 1 pld.,
08.26-08.30. 13 pld., 09.01. 46 pld., 09.07. 35 pld.,
09.14. 1 pld. (a VIII-as tavon), 09.28. 2 pld., 10.
06. 11 pld., (a Kondáson), Fekete rét 08.20. 1 pld.,
08.22. 2 pld., Konyári Sóstó 09.01. 5 pld. szikes
tó.
- 1986: Fényes 04.05. 1 pld., Hortobágyi halastó 04.09. 6
pld., 05.17. 3 pld., 05.31. 10 pld., 06.01. 2 pld.
(a Kondáson), 07.21. 3 pld., 07.31. 3 pld., 08.04.
1 pld., 08.10. 1 pld., 08.23. 1 pld., 09.06. 1 pld.
(a III-as tavon), Fekete rét 07.26. 1 pld., Akadé-
miai tavak (szikes libanevelő), 07.27. 1 pld., 08.01.
2 pld., 08.04. 3 pld., 08.06. 3 pld., 08.14. 6 pld.,
08.23. 1 pld., Hosszúpályi 07.22. 2 pld. szikes tó,
Csécsi tó 07.27. 1 pld., Gyökérkúti tó 09.13.-09.14.
1 pld.
- 1987: Csécsi tó 07.29. 21 nászruhász pld., 07.30. 14 pld.,
08.01-08.03. 9 pld., 08.07. 6 pld., 08.11. 3 pld.,
08.12.-08.17. 1 pld., 08.03. 9 pld., 08.07. 6 pld.,
08.22.-08.23. 1 pld., 08.24.-08.25. 4 pld., Árkusi
libanevelő 08.20. 5 pld., Akadémia tavak (szikes li-
banevelő) 08.11. 1 pld., 08.15. 1 pld., 08.30. 1 pld.,
08.31. 2 pld., 09.05. 1 pld., Hortobágyi halastó
09.19. 3 pld., 10.04. 1 pld., 10.24. 2 pld., Ohati
tavak 10.31. 1 pld.
- 1988: Hortobágyi halastó 03.26. 1 pld. a III-as tavon,
08.01. 1 pld., 08.09. 3 pld., 08.18. 8 pld., 08.22.

19 pld., 08.25. 32 pld., 08.27. 45 pld. (a VI-os ta-
von, Akadémia tavak, Kacsauisztató), 08.09. 1 pld.,
08.22. 4 pld., Árkusi libanevelő 08.22. 2 pld.

Emri Tamás, Győrösy Tamás,

Zeke Tamás

MEGGYEL ETETŐ DANKASIRÁLYOK (LARUS RIDIBUNDUS). 1989.
június 24-én kerestem fel a Nyíregyháza-Sóstó melletti si-
rálytelepet. A kb. 300 fészek zömmel sászsombékokon épült,
s a még tojásos aljak mellett nagyrészt már repülő fió-
kákat láttam. Csaknem minden fészek peremén számos ép,
vagy szétcsipkedett meggyet, valamint sok magot észleltem,
s az öregek ekkor is hordták a gyümölcsöt a pár száz mé-
terre fekvő gyümölcsöskertekből. A meggyet a sirályok - a
kíséretemben lévő Dr. Haydu Lajos elmondása szerint - a fák
csúcsa körül lebegve kapkodták le. Megemlítem, hogy a dan-
kasirályok cseresznye-evéséről 1957-ben, a szegedi Fehér-
tóról Dr. Beretzk Péter számolt be.

Endes Mihály

KAKUKKFIÓKA (CUCULUS CANORUS) FÜSTIFECSKE FÉSZEK-
BEN. 1989. július 26-án, Hortobágy-Szásztelken, a gyógyszerrak-
tár ajtaja fölötti füstifecske fészekben, egy kb. 2-3 he-
tes kakukkfiókát vettem észre. Az épület a település köz-
pontjában, de zavartalan helyen áll. Július 28-án és 30-
án a fiókát a fészekben találtam - le is fotóztam - a
fecskepár szorgalmasan etette. Augusztus 16-án sem a fé-

szekben, sem annak környékén nem láttam, a közben minden bizonnyal kirepült kakukkot. A következő évben a fészek üresen állt.

Déri János

UHU (BUBO BUBO) KÖLTÉSE A BEREGI-SÍKSÁGON. Négy éve folyó rendszeres ellenőrzés dacára sem került elő eddig az uhu fészke a vidéken, jóllehet többször is jelezték a faj előfordulását. 1988. április 4-én egy összetartó pár rendszeres mozgásáról és huhogásáról érkezett hitelesnek tűnő beszámoló. Május 21-én azután megpillantottuk a költőürege előtt üldögélő hatalmas termetű tojót. Egy hét múlva két, szépen fejlett fióka mutatkozott az üreg szájában, újabb két hét múlva viszont csak egy, már csaknem repülős fiatal került szem elé. Ősszel köpeteket is gyűjtöttünk, amelyek elemzése a következő: Carabida 7 db., Phasianus colchicus tojó 1 pld., Columba spec. 8 db., Microtus arvalis 6 db., Apodemus microps 1 db., Rattus norvegicus 2 db.

Miután 1989-ben a fészek lakatlannak bizonyult, itt és e területtől nem nagy távolságban egy-egy pár, NSZK-ból származó, mesterségesen nevelt uhut helyeztünk ki, tartós megtelepedésük reményében.

Endes Mihály, Sándor István,

Dudás Miklós

FENYŐRIGÓ (TURDUS PILARIS) KÖLTÉSE KEMECSÉN. 1989. június 3-án a Vízmeder nevű területrészt mocsárretjének egyik

idős fehér fűzfáján találtam meg a faj lakott fészket. Június 24-én már a kirepült 3 fiókát etette a pár.

Endes Mihály

KIS POSZÁTA (SYLVIA CURRUCA) SZOKATLAN FÉSZKELÉSE.

1989. június 4-én Debrecenben, a Kiss Ernő utcában egy korai juharfa lombkoronájának felső harmadában, kb. 3,8 m magasságban épült, lakott kis poszáta fészket találtam. A szakirodalom egy méter feletti fészkepítésről nem tesz említést.

Micskei Zsolt

VEGYES GÉMTELEP NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓN. 1989. június 24-én Dr. Haydu Lajos kalauzolásával meglátogattam egy több hektáros, sekély, iszapos medrű tavat. A partot kevés nád és keskenylevelű gyékény szegélyezi, s benne kisebb fehér és rekettyefűz csoportok találhatók, melyek zöme már kipusztult. Az itt költő 21 (!) madárfaj közül most csak a száraz rekettyefűzekre épült "gémfaluról" számolok be: üstökös gem (Ardeola ralloides) 1 pár; kis kócsag (Egretta garzetta) 10 pár, a fészekben pelyhesek; bakcsó (Nycticorax nycticorax) kb. 50 pár, repülős fiókák; kanalasgém (Platalea leucorodia) 3 pár kotlik. A bakcsótól eltekintve, amelyek itteni telepe már régebben ismert, feltűnően késői költésekről van szó, amely más, távolabbi területről történő áttelepedést is jelezhet.

Endes Mihály

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖRNYÉKÉN 1988-BAN MEGFIGYELT NAPPALI RAGADOZÓMADARAK.

Vörös kánya (*Milvus milvus*): 01.11-én Pród környékén 2 pld. jelent meg és 15-éig tartózkodott a területen. 12.07-én délután 1 pld. körözött a Virágoskúti-halastó mellett. Feltehetően ugyanaz a példány volt, amelyet 12.09-én és 13.-án Pródon láttak.

Barna kánya (*Milvus migrans*): Első tavaszi adata 04.02. 1 pld., Hajdúvid környéke. Utolsó őszi adata 09.11. ugyanott. Egyéb adatai: 04.07. 1 pld. Hajdúvid, 05.07. 2 pld. Virágoskút, 05.15. 1 pld. Hajdúvid, 07.17. 2 pld. Pród, 07.28. 1 pld. Hajdúdorog, 07.29. Hajdúvid, 08.18. 1 pld. Pród, 08.20. 1 pld. Pród. Költése Hajdúdorog környékén valószínű; szívesen jár a Vidi-tóra vadászni.

Héja (*Accipiter gentilis*): Télen valamennyi területen felbukkant. Költése csak Pród környékén volt. (A Városerdőn több éves hagyományos költése '88-ban nem valósult meg.)

Kishéja (*Accipiter brevipes*): 08.09. 1 hím Pród, Tisza-zugi-erdő.

Karvaly (*Accipiter nisus*): Tavasszal 04.30.-án láttuk az utolsókat, 2 pld.-t Bagotán. Ősszel 09.18-án 1 pld. jelent meg Pródon. Télen minden területen előfordul, beleértve Hajdúböszörmény belvárosát is.

Pusztai ölyv (*Buteo rufinus*): Első idej adata: 03.19. 1 pld. Virágoskút. További adatai: 04.03. 1 pld. Bagota, 07.26. 1 pld. Bagota, 07.27. 1 pld. Pród, 09.10. 1 pld. Virágoskút.

Egerészölyv (*Buteo buteo*): A Városerdőn 3 pár költött. Nászrepülését egyéb területek felett is megfigyeltük, de a költésre számszerű adataink nincsenek. Száma télen felduzzad, a legtöbb 12.09. 45 pld. Pród.

Gatyásölyv (*Buteo lagopus*): Utolsó tavaszi adata: 04.04. 1 pld. Pród. Első őszi adata: 10.16. 1 pld. Virágoskút. Törpesas (*Hieraaëtus pennatus*): 08.07. 1 világos színváltozatú pld. Pród.

Szírti sas (*Aquila chrysaëtos*): Adatai: 02.20. 1 juv. Virágoskút, 02.27. 1 juv. Virágoskút, 03.18. 1 juv. Bagota, 10.09. 1 juv. Virágoskút.

Parlagi sas (*Aquila heliaca*): 08.29. 1 pld. Bagota.

Békászó sas (*Aquila pomarina*): Adatai: 04.04. 1 pld. Pród, 07.26. 2 pld. Bagota, 08.29. 1 pld. Bagota, 09.11. 1 pld. Hajdúvid.

Réti sas (*Haliaeetus albicilla*): Télen rendszeres a Virágoskúti-halastavakon és környékén. Adatai: 01.09. 3 ad. 1 juv., 02.14. 2 pld., 02.20. 3 ad. 4 juv., 02.21. 2 pld., 1 ad. 1 juv., 03.05. 2 ad. 1 juv., 03.12. 2 ad., 03.13. 1 juv., 03.19. 1 ad., 11.07. 4 pld., 11.13. 1 ad., 11.19. 1 pld., 12.03. 6 ad., 12.13. 4 juv., 12.17. 1 ad. 3 juv., 12.22. 5 pld., 02.27. 1 pld., Hajdúvid, 04.07. 1 ad., 1 juv. Lovász-tó (Hajdúböszörmény).

Kékes rétihéja (*Circus cyaneus*): Télen mindegyik területen előfordul. Utolsó tavaszi adata: 04.17. 1 tojó Pród. Első őszi adata: 10.05. 1 pld. Pród. Legtöbb 12.09. 3 hím 18 tojó, Pród.

Hamvas rétihéja (*Circus pygargus*): Adatai: 04.30. 1 tojó Bagota, 1 hím Pród, 06.26. 1 hím Virágoskút, 07.30. 1 hím Pród, 08.13. 1 tojó Pród, 08.20. 1 hím Pród, 08.29. 2 pld. Bagota, 10.01. 1 pld. Pród.

Barna rétihéja (*Circus aeruginosus*): Gyakorisága miatt állományára nincsen számszerű adatunk. A Vidi-tó nádasában 3 pár költött. Első tavaszi adata: 03.19. 2 pár Virágoskút, utolsó őszi adata: 10.01. 1 pld. Pród.

Halászsas (*Pandion haliaëtus*): Adatai: 04.03. 1 pld. Virágoskút, 04.04. 1 pld. Pród, 04.16. 1 pld. Virágoskút, 04.17. 1 pld. Pród, 04.23. 1 pld. Pród, 05.07. 1 pld. Virágoskút, 10.09. 1 pld. Virágoskút.

Kerecsensólyom (*Falco cherrug*): Szórványosan előfordul. Adatai: 07.23. 1 pld. Hajdúvid, 07.30. 1 pld. Pród, 09.11. 1 pld. Hajdúvid.

Vándorsólyom (*Falco peregrinus*): Adatai: 09.10. 1 pld. Virágoskút, 10.19. 1 pld. Lovász-tó, 10.23. 1 pld. Pród, 11.18. 2 pld. Virágoskút, 11.19. 2 pld. Virágoskút, 12.09. 1 pld. Pród.

Kabasólyom (*Falco subbuteo*): Első tavaszi adata: 04.24. 1 pld. Városerdő. Utolsó őszi adata: 09.24. 2 pld. Pród, 2 pld. Virágoskút, 1 pld. Bagota. A Városerdőn 1 pár fészkel. Költött 1 pár Macs környékén, Pród legelő erdősávjában, Virágoskút környékén és Bagotán. Szívesen vadászik kék vércsék társaságában.

Kis sólyom (*Falco columbarius*): Utolsó tavaszi adata: 03.20. 2 pld. Városerdő. Az első őszi adata: 09.19. Virágos-

kút. Télen minden területen előfordult.

Kék vércse (*Falco vespertinus*): Első tavaszi adata 05.01.

1 pld. Pród. Utolsó őszi adata: 09.17. 1 pld. Virágoskút.

Költ Bakóhát környékén egy-egy erdőfoltban; a Keleti-főcsatorna erdősávjában Hajdúnánás felé. Vonuláson minden területen előfordult.

Fehérkarmú vércse (*Falco naumanni*): 05.14. 1 hím a Keleti-főcsatorna Kispródi hídjánál.

Vörös vércse (*Falco tinnunculus*): Egész évben előfordult a területeken. Gyakori fészkelő, de a Városerdőn nem költ.

MME Hajdúböszörményi Munkacsoport

Nagy Antal

ÚJABB ADATOK HAJDÚNÁNÁS ÉS KÖRNYÉKE MADÁRVILÁGÁHOZ

(1989). A Calandrella II/2. számában jelent meg az "Adatok Hajdúnánás és környéke madárvilágához (1988)" c. fajlistánk. A mostani, kiegészítő adatok az 1989. augusztus 5-14. között megrendezett Állat- és Természetvédelmi Tábor madarász csoportja által ugyanazon a területen végzett megfigyelések közül valók. A tábor idején 5 alkalommal voltunk kint a területen, napos, meleg időben.

A csoport tagjai voltak: Becske Gábor, Benkő Krisztián, Gulyás Zsolt, Katona Gábor, B. Kiss Péter, Kiss László, Kordás Sándor, Lajter Zoltán, Molnár Balázs, Szabó Attila, Szabó Tamás, Szilágyi Attila, Tóth Csaba.

Kis kócsag (*Egretta garzetta*). 2 példány volt minden megfigyelési alkalommal látható a libatelepi tavon, illetve

a mellette lévő vizenyős réten.

Vörös gém (*Ardea purpurea*). Szürke gémekkel együtt 10 példányát láttuk lucernatáblában, 1-1 példányát a libatelepi tavon és az I-es csatorna partján.

Kanalasgém (*Platalea leucorodia*). 2 alkalommal láttunk 2 példányt a libatelepi tavon.

Böjti réce (*Anas querquedula*). 2 példánya volt a libatelepi tavon.

Törpesas (*Hieraaëtus pennatus*). Lásd Szilágyi Attila leírását!

Fürj (*Coturnix coturnix*). 3 példányát láttuk.

Füstös cankó (*Tringa erythropus*). 20-50 példányát láttuk minden alkalommal a libatelepi tavon és a vizenyős réten.

Piroslábú cankó (*Tringa totanus*). Lásd az előző fajt!

Szürke cankó (*Tringa nebularia*). 5-6 példánya volt látható.

Erdei cankó (*Tringa ochropus*). 2 példányát láttuk.

Réti cankó (*Tringa glareola*). 50-60 példány.

Havasi partfutó (*Calidris alpina*). 2 példány.

Kis sirály (*Larus minutus*). 1 példánya volt látható.

Zöld küllő (*Picus viridis*). 2 példány.

Partifecske (*Riparia riparia*). 40-50 példányt láttunk.

Szajkó (*Garrulus glandarius*). A libatelepi tó melletti erdősávban láttunk 2 példányt.

Barátkaposzáta (*Sylvia atricapilla*). Lásd az előző fajt!

Fitisz füziike (*Phylloscopus trochilus*) 1 példányát halottuk.

Szürke légykapó (*Muscicapa striata*). 2 példány.

Zöldike (*Carduelis chloris*). 1 példányban láttuk.

Tóth Ildikó, T. Horváth Ildikó

ADATOK PÜSPÖKLADÁNY ÉS KÖRNYÉKE MADÁRVILÁGÁHOZ. 1988-ban hat kerecsensólymot láttunk és fényképeztünk a Farkaslóré nevezetű területen. 1989-ben kuvikot, egy jégmadarat (július végén) és számos szalakótát figyeltünk meg.

Kozák Lajos, Ludman Árpád

MADÁRTANI MEGFIGYELÉSEK A HORTOBÁGYI-HALASTAVAKON. 1989. szeptember 9-én az alábbi érdekesebb fajokat láttuk: kígyászölyv, ujjaslile, kis póling, gulipán, vékonycsőrű víztaposó, sarlósfecske, jégmadár, széncinege, kék cinege, fenyvescinege.

Gyüre Péter, Mezey Mónika,

Seprényi Attila

FÖLDIKUTYA (*SPALAX LEUCODON*) TELEP AZ ÉSZAKI NYÍR-SÉGBEN. 1989. szeptember 23-án Anarcstól DK-re, műút mellett elterülő rontott homoki legelőn találtuk meg a feltehetően 4-5 állatból összetevődő telepet. Ugyanitt kevés ürge is él. Eddigi ismereteink szerint ez a legészakabbra fekvő hazai telep.

Endes Mihály, Balogh Péter,

Micskei Zsolt

PATKÁNYFEJŰ POCOK (MICROTUS DECONOMUS) LELET DERECSKÉN.

1989 szeptember 7-én gyűjtött gyöngybagoly köpetből, 1452 zsákmányállat közül került ki egy mandibula. A gyűjtés helyének közelében szántóföldek, kisebb szikes tó és legelő terül el. A Duna-Tisza-közi megfigyelésekhez hasonlóan itt is csak egy felmorzsolódó populáció-töredékre gondolhatunk, ám ez jelenti az eddigi egyetlen adatot a tiszai Alföldről.

Balogh Péter

Varangyakció 88

A második varangymentő akció előkészületei már 1987 októberében megkezdődtek. Az első akcióról számos előadás hangzott el, s tevékenységünkről a sajtó, a rádió és a televízió is beszámolt. Kételtűek és Hullók Napját is szerveztünk. A 800-1000 ember előadásokat hallhatott, filmvetítéseket és állatbemutatót is megtekinthetett. Több száz plakátot is kihelyeztünk. Csatlakozott hozzánk a VI. kerületi Természetbarát Bizottság és a KOKO Eszperantista Környezetvédő Társaság. Céljaink között még több állat mentése, új helyszínek felderítése és nemzetközi akció szervezése szerepelt.

Az idén öt helyszínre jutottunk el. A Királyrétre nap-pali, a többi helyre éjszakai mentést terveztünk. A módszer valamennyi csoportnál azonos volt, vödörbe gyűjtöttük az állatokat, majd határozás és mérés után veszélytelen szakaszon engedték el őket. (Puky Miklós)

Zemplén: 37 fős csapatunk nem talált menteni való békákat, de találkoztunk az emberi kegyetlenség jelével. Féltucatnyi barna varangyot találtunk tűzre vetve. A szerencsétlen állatok egyike-másika még ott vonaglott a forró parázson, mikor odaértünk, de sajnos az életüket már nem tudtuk megmenteni. (Krolopp András)

Parassapuszta: 60 ember, köztük lengyelek is részt vettek az akcióban. 13 nap alatt 7034 állatot mentettünk át biztonságos petézőhelyre. (Ádám János)